Wege aus der aktuellen menschengemachten Umwelt- und Klimakrise

Teil II – Das Erdsystem und der Klimawandel

Simon Wehden

simon.wehden@gmail.com

Gliederung

1. Kurze Wiederholung
2. „Kippen“ des Erdsystems
3. Klimasystem & Klimawandel
4. Klimafolgen
5. Treibhausgase & Budget

Kurze Wiederholung des letzten Vortrags

Große Beschleunigung

Socio-economic trends

Earth system trends

Steffen W et al. (2015) The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration. *The Anthropocene Review* 2:81-98

Planetare Grenzen: „Der sichere Operationsrahmen“

- Holozän: Rahmen natürlicher Lebensbedingungen gesamter Zivilisationsgeschichte der Menschheit
- Rahmen verlassen: Gefährdung für Entwicklung
 - ? Beendigung der Armut
 - ? Gesunde Lebensbedingungen
 - ? Gesellschaftliche und wirtschaftliche Stabilität
 - ? Gerechtigkeit und Frieden

→ Vermutlich nicht möglich ohne das Fundament einer stabilen Umwelt und intakten Natur

Intaktheit der Biosphäre

Beiträge der Natur zum Menschen nicht ersetzbar & abnehmend (IPBES, 2019)

Das „Kippen“ des Erdsystems

Was bedeutet eigentlich „Kippen“?

Das „Kippen“ ist der Übergang von einem Zustand in einen anderen, mit einer anderen Funktionsweise.

Erdgeschichtliche Belege für solches globales Kippen:

- z.B. Eintritt in Eiszeitzyklen vor 2,6 Millionen Jahren
- Regionales Kippen z.B. Beginn und Ende der letzten Eiszeit (80.000 und 10.000 Jahre zuvor)

Lenton T M et al. (2019) Climate tipping points – too risky to bet against. *Nature*

Was bedeutet eigentlich „Kippen“?

Das „Kippen“ ist der Übergang von einem Zustand in einen anderen, mit einer anderen Funktionsweise.

Um die Vorstellung anzuregen:
CO₂-Niveau so hoch wie seit über
4 Millionen Jahren nicht

Damals:

Keine Polkappen, anderer Verlauf
der Meeresströmungen,
verschobene Klimazonen

Lenton T M et al. (2019) Climate tipping points – too risky to bet against. *Nature*

Was bedeutet eigentlich „Kippen“?

Historisch: Erdgeschichtliches Kippen des Erdsystems Folge von Veränderungen der Erdumlaufbahn (moderater Strahlungsantrieb)

Heute: Treibhausgase, Geschwindigkeit der Temperaturänderung eine Größenordnung schneller als bei der letzten Entgletscherung

Lenton T M et al. (2019) Climate tipping points – too risky to bet against. *Nature*

Kipppunkte und ihre Verbindungen

- Manche Kipppunkte sind gefährlich nahe ($\sim 1,5^\circ\text{C}$) oder sogar schon übertreten (Eisschilde)
- GAU: Kaskade von Kipppunkten, bei der ein Kipppunkt den nächsten Lostritt und zum globalen Kippen des Erdsystems führt

Kipppunkte und ihre Verbindungen

ABER: Narrativ eines zu spät falsch und gefährlich!!!

Selbst wenn z.B. das Grönland-Eisschild unwiederbringlich verloren geht (Kipppunkt losgetreten) haben wir immer noch Kontrolle über die Geschwindigkeit des Tausens, indem wir die Überschreitung des Kipppunktes minimieren (mehr dazu später)

Lenton T M et al. (2019) Climate tipping points – too risky to bet against. *Nature*

Klimasystem und Klimawandel

Energiehaushalt der Erde

- Einstrahlende Energie: kurzwelliges, sichtbares Licht & UV von der Sonne
- Ausstrahlende Energie: Wärmestrahlung (Infrarotstrahlung), hängt von der Temperatur der Erde ab
- Erde ohne Atmosphäre (Schwarzer Körper): Durchschnittstemperatur -18°C
- → Natürlicher Treibhauseffekt auf Grund von Spurengasen
- Wasserdampf (65% des Treibhauseffekts) und CO₂ (22%)
- Bewirken einen (natürlichen) Treibhauseffekt von ca. 30°C

Zusammensetzung der Luft^[1]

1. Stickstoff: 78,08%
2. Sauerstoff 20,95%
3. Argon: 0,93%

Ferner liefern:

Kohlenstoffdioxid: 0,04%,
genauer: 416 ppm (8.6.2020)^[2]

[1] <http://cdiac.ornl.gov/tracegases.html>, zuletzt aufgerufen: 18.2.2020

[2] <https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/monthly.html>, zuletzt aufgerufen: 08.06.2020

CO₂ absorbiert elektromagnetische Strahlung im IR-Bereich.

Sauerstoff und Stickstoff nicht.

Abschwächung der Lichtintensität

Distanz, nach der 2/3 der Lichtintensität absorbiert wird

- Selbst bei CO₂-Konzentrationen unter 0,5% absorbiert die Atmosphäre bereits weite Teile des IR-Spektrums
- Winzige Moleküle haben große Einflussphären bei Wechselwirkung mit Strahlung
- Kein Effekt auf sichtbares Licht, nur auf IR-Licht absorbiert
- Wärmestrahlung wird von CO₂ absorbiert und wird letztendlich langsamer wieder ausgestrahlt

Energiehaushalt bei Erhöhung der CO₂-Konzentration

Ungleichgewicht aus einfallender und ausfallender Energie (mit Satelliten messbar) → Strahlungsantrieb → Erderwärmung

Aktueller Anthropogener Strahlungsantrieb:

$$1,7 \text{ W/m}^2 (\text{CO}_2) + 1 \text{ W/m}^2 (\text{CH}_4) + \dots \approx 2,8 \text{ W/m}^2$$

Globale Temperaturänderung

Global temperature change (1850–2017)

@ed_hawkins

IPCC (2018) Sonderbericht 1,5°C Globale Erwärmung. Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger

- Land erwärmt sich schneller als Meer
- Arktis erwärmt sich 2-3x so schnell wie der Durchschnitt
- Anthropogene Erwärmung in 2018: ca. 1°C mit Erwärmung von +0,2°C pro Jahrzehnt
- Aktuelle Emissionen werden *unwahrscheinlich* zu 1,5°C führen (weniger)

Klimafolgen

Wenn sich die Pole erwärmen

... wird es lokal nicht unbedingt wärmer.
Denn es nimmt die Temperaturdifferenz
zwischen Arktis und Tropen ab

- der Golfstrom flaut ab → Europa wird kälter
- Jetstream „zerfranst“ → Rekordwinter in USA 2018/2019 mit viel arktischer Luft^[1] → Republikaner: „*Das nennt ihr Erderwärmung?*“

... kann aber auch zu Hitzewellen führen

- Rekordsommer 2018 ebenfalls auf Anomalien des Jetstreams zurückzuführen (Hochdruckgebiet zieht nicht ab)

[1] <https://www.sueddeutsche.de/wissen/usa-kaeltewelle-polarwirbel-polar-vortex-kaelte-klimawandel-1.4310718>, zuletzt aufgerufen: 5.11.2019

[2] Kornhuber K et al. (2019) Extreme weather events in early summer 2018 connected by a recurrent hemispheric wave-7 pattern. Environ. Res. Lett. 14

Klimawandel macht das Wetter extremer, nicht einfach nur „wärmer“

Regenfälle

- Eine wärmere Atmosphäre kann mehr Wasserdampf aufnehmen
- Menge an Wasser in Atmosphäre größer
- Gesamtmenge an Niederschlag nimmt zu, aber lokal unterschiedlich und vermehrt in Form von *Extremwetter*

Folgen und Risiken ausgewählter Systeme

Erwärmung
in °C

© IPCC, 2018, modified by Gregor Hagedorn, used by permission to Scientists for Future

Klimafolgen nach 1,5°C IPCC Bericht

1,5°C

- 7% der globalen Landfläche durchlaufen Transformation der Ökosysteme
- ein Sommer mit meereisfreiem arktischen Ozean pro Jahrhundert
- Korallenriffe gehen um 70-90% zurück

2°C

- 13% der globalen Landfläche durchlaufen Transformation der Ökosysteme
- ein Sommer mit meereisfreiem arktischen Ozean pro Jahrzehnt
- Korallenriffe gehen um >99% zurück

Meeresspiegelanstieg

- Kipppunkte liegen zwischen $1,5^{\circ}\text{C}$ und 2°C und sind möglicherweise schon jetzt losgetreten (Grönland)
- West Antarktis: + 3 Meter über Jahrhunderte bis Jahrtausende
- Ost Antarktis: + 3-4 Meter über Jahrhunderte
- Grönland: + 7 Meter über Jahrtausende
- Vermeidung weiterer Treibhausgase würde die Geschwindigkeit der Veränderung deutlich Bremsen und Anpassungsmöglichkeiten bieten → Geschwindigkeit der Veränderung hängt ab von Überschreitung des Kipppunktes
- Weniger die Frage ob wir einen Meeresspiegelanstieg von über 10 m bekommen, sondern über welchen Zeitraum: 1.000 Jahre (2°C) oder 10.000 Jahre ($1,5^{\circ}\text{C}$)?
- Narrativ eines „Es ist zu spät“ **falsch** und **gefährlich**

Lenton T M et al. (2019) Climate tipping points – too risky to bet against. *Nature*

Treibhausgase und Budget

Keeling Kurven: Der Klimawandel ist menschengemacht

Der Anstieg der CO₂ Konzentration geht mit einem Abfall der O₂ Konzentration einher und die Isotopenverteilung des Kohlenstoffs zeigt: Das CO₂ stammt aus der Verbrennung fossiler Rohstoffe.

Ralph Keeling's record of atmospheric oxygen, taken in places like Australia's Cape Grim, show a small but steady decline consistent with increased use of fossil fuels.
Image 2 of 9

CLOSE X

Quellen atmosphärischen CO₂s

Global Carbon Project

Wo bleibt das CO₂?

- 50% bleiben in der Atmosphäre
- 30% gehen in die Biosphäre
- 20% gehen ins Meer

C (Atm) ↔ C (Bio)

C (Atm) ↔ C (Meer)

Aber: Anteil in Biosphäre und Meer nimmt ab → Senken scheinen sich zu sättigen

Was passiert mit dem CO₂-Level?

- mindestens 50% unserer Emissionen bleiben ewig (hunderte bis tausende Jahre) da oben
- 30% ist in der Biosphäre und kann jeder Zeit auch da oben landen (siehe Abholzung, Buschbrände etc.)
- Gaaaaaanz laaaangsaaaam bildet sich Öl und Kalkstein am Meeresboden (Jahrmillionen)

Die vielleicht wichtigste Lehre...

Jedes Temperaturziel entspricht einem CO₂-Budget

CO₂-Minderungspfade: 1.5 °C

CO₂-Minderungspfade: 2 °C

2°C: Die Trillionste Tonne Kohlenstoff

Spitzen-Erderwärmung wird bestimmt durch die kumulierten CO₂-Emissionen (Gesamtemissionen) und nicht durch den Emissionspfad!

Eine Trillionen Tonnen Kohlenstoff-Emissionen seit der Industrialisierung (bzw. 3,65 Gt CO₂) bringen eine Erwärmung von 2°C (1,3-3,9°C).

In anderen Worten:

Um die Erderwärmung aufzuhalten müssen die Emissionen auf Null gehen!

Es ist egal, wie wir runterkommen! Es zählt NUR die Menge an CO₂, die wir bis zur Nettonull ausgestoßen haben.

Allen M et al. (2009) Warming caused by cumulative carbon emissions towards the trillionth tonne. Nature 458

Was ist mit anderen Treibhausgasen?

Darstellung häufig: 1 kg Methan sind so schlimm wie 4, 28, 84 ... kg CO₂

→ Halbwertszeit von Methan ca. 15 Jahre

→ CO₂-Äquivalente hängen aber ab, über welchen Zeitraum man spricht

→ Unmittelbarer Effekt CH₄ = 120x CO₂

→ 20 Jahre CH₄ = 84x CO₂

CO₂-Äquivalente???

Verlauf Temperaturänderung gegen Zeit bei einem einmaligen Puls aller Treibhausgas-Emissionen a

IPCC: Netto-Null CO₂ Emissionen und fallende nicht-CO₂ Emissionen würden die Erderwärmung zum Halten bringen.us 2011

Paris reicht nicht aus

Zusammenfassung

- Erderwärmung seit der Industrialisierung liegt bei ca. 1°C und schreitet mit $0,2^{\circ}\text{C}$ fort
- Sie ist eine Folge des Strahlungsantriebs, d.h. des Ungleichgewichts aus eintretender und austretender Energie
- Der Strahlungsantrieb ist auf die anthropogenen Treibhausgasemissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe zurückzuführen
- Über 50% unserer CO_2 -Emissionen bleiben Jahrtausende in der Atmosphäre
- Für beliebige Begrenzung der Erderwärmung müssen die Emissionen auf Null sinken → jedes Temperaturziel entspricht einem Emissionsbudget
- Folgen des Klimawandels deutlich geringer bei $1,5^{\circ}\text{C}$ als 2°C → Anpassungsmöglichkeiten
- Einzelne Kipppunkte werden bei ca. $1,5^{\circ}\text{C}$ losgetreten (z.B. Grönlandeisschild wird dann unwiederbringlich kollabieren) ABER Geschwindigkeit hängt ab von Höhe der Überschreitung (z.B. +10m Meeresspiegelanstieg in 1.000 oder 10.000 Jahren)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kohlenstoffkreislauf

1. Biosphäre

- Alte (Ur-)wälder sind im Gleichgewicht aus Wachsen (Senke) und Vergehen (Quelle)
- junge, wachsende Wälder entziehen CO_2
- CO_2 -Düngung: Erhöht man die CO_2 -Konzentration in der Atmosphäre „düngt“ das die Pflanzen und befördert ihr Wachstum → hört man auf zu emittieren, dann entziehen Urwälder auch kein CO_2
- Biosphäre nimmt also nur CO_2 auf, wenn sie nicht im Gleichgewicht mit Atmosphäre steht
- Biosphäre nur so lange CO_2 -Speicher, wie sie geschützt und intakt ist → degradierende Biosphäre setzt CO_2 frei

Kohlenstoffkreislauf

1. Biosphäre

- Aber: Großteils des Kohlenstoffs in den Böden
- Fähigkeit der Böden, Kohlenstoff zu binden, zentral für Senkenfunktion
- Erhöhung der organischen Bestandteile im Boden (Humus)
- Degradierung von Böden setzt Kohlenstoff frei
- Restaurierung und Schutz der Böden zentral für Klimaschutz (Synergie mit Biodiversität)

Ist der Klimawandel wirklich menschengemacht?

Zuschreibung des Temperaturanstiegs zu externen Einflussfaktoren

Anthropogene und natürliche Einflussfaktoren

Beste Beschreibung mit maximaler Flexibilität der natürlichen Einflüsse und CO_2 -Einfluss = 0 Pruitt

Residuen korrelieren auffallend gut mit erwartetem anthropogenen Einfluss

Methode kleinster Fehlerquadrate: Menschlicher Einfluss auf beobachtete Erwärmung bei 8 Pruitt = 0,8°C